# PCT WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

C07D 493/04, C07C 47/21, C07D 319/06, 277/24, C07C 59/01

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

5. März 1998 (05.03.98)

WO 98/08849

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE97/00111

A1

(22) Internationales Anmeldedatum: 15. Januar 1997 (15.01.97)

(30) Prioritätsdaten:

30. August 1996 (30.08.96) DE 196 36 343.8 28. Oktober 1996 (28.10.96) DE 196 45 361.5 DE 28. Oktober 1996 (28.10.96) 196 45 362.3

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): NOVAR-TIS AKTIENGESELLSCHAFT [CH/CH]; Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

(72) Erfinder; und

SCHINZER, Dieter (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): [DE/DE], Neuköllnstrasse 33, D-38108 Braunschweig (DE). LIMBERG, Anja [DE/DE]; Autorstrasse la, D-38102 Braunschweig (DE). BÖHM, Oliver, M. [DE/DE]; Kreuzstrasse 109, D-38118 Braunschweig (DE). BAUER, Armin [DE/DE]: Spielmannstrasse 16, D-38106 Braunschweig (DE). CORDES. Martin [DE/DE]; Alte-Wiegk-Ring 12, D-38106 Braunschweig (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: AL, AM, AT, AU, AZ, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GE, HU, IL, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, TJ, TM, TR, TT, UA, UG. US, UZ, VN, ARIPO Patent (KE, LS, MW, SD, SZ, UG). eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, ML, MR, NE, SN, TD,

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING EPOTHILONES, AND INTERMEDIATE PRODUCTS OBTAINED DURING THE PRODUC-TION PROCESS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON EPOTHILONEN UND ZWISCHENPRODUKTE INNERHALB DES **VERFAHRENS** 

(57) Abstract

The invention pertains to a method for producing epothilones and also relates to intermediate products obtained during the production process. Epothinone A and B are natural substances which can be produced by microorganisms and have similar properties to those of taxol and, therefore, are of interest to the pharmaceutical chemistry.

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft Verfahren zur Herstellung von Epothilonen und Zwischenprodukte innerhalb des Verfahrens. Epothilon A und B sind Naturstoffe, die durch Mikroorganismen hergestellt werden können und die Taxol-ähnliche Eigenschaften besitzen und somit besonderes Interesse in der Arzneimittelchemie besitzen.

#### LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

| AL | Albanien                     | ES | Spanien                     | LS  | Lesotho                     | SI  | Slowenien              |   |
|----|------------------------------|----|-----------------------------|-----|-----------------------------|-----|------------------------|---|
| AM | Armenien                     | FI | Finnland                    | L.T | Litauen                     | SK. | Slowakei               |   |
| AT | Osterreich                   | FR | Frankreich                  | LU  | Luxemburg                   | SN  | Senegal                |   |
| ΑU | Australien                   | GA | Gabun                       | LV  | Lettland                    | SZ  | Swasiland              |   |
| AZ | Aserbaidschan                | GB | Vereinigtes Königreich      | MC  | Monaco                      | TD  | Tschad                 |   |
| BA | Bosnien-Herzegowina          | GE | Georgien                    | MD  | Republik Moldau             | TG  | Togo                   |   |
| BB | Barbados                     | GH | Ghana                       | MG  | Madagaskar                  | TJ  | Tadschikistan          |   |
| BE | Belgien                      | GN | Guinea                      | MK  | Die ehemalige jugoslawische | TM  | Turkmenistan           |   |
| BF | Burkina Faso                 | GR | Griechenland                |     | Republik Mazedonien         | TR  | Türkei                 |   |
| BG | Bulgarien                    | HU | Ungam                       | ML  | Mali                        | TT  | Trinidad und Tobago    |   |
| BJ | Benin                        | IE | Irland                      | MN  | Mongolei                    | UA  | Ukraine                |   |
| BR | Brasilien                    | IL | [srae]                      | MR  | Mauretanien                 | UG  | Uganda                 |   |
| BY | Belarus                      | IS | Island                      | MW  | Malawi                      | US  | Vereinigte Staaten von |   |
| CA | Kanada                       | IT | Italien                     | MX  | Mexiko                      | ••• | Amerika                |   |
| CF | Zentralafrikanische Republik | JР | Japan                       | NE  | Niger                       | UZ  | Usbekistan             |   |
| CG | Kongo                        | KE | Kenia                       | NL  | Niederlande                 | VN  | Victnam                |   |
| CH | Schweiz .                    | KG | Kirgisistan                 | NO  | Norwegen                    | ΥU  | Jugoslawien            | _ |
| CI | Côte d'Ivoire                | KP | Demokratische Volksrepublik | NZ  | Neusceland                  | ZW  | Zimbabwe               |   |
| CM | Kamerun                      |    | Korea                       | PL  | Polen                       |     | ***********            |   |
| CN | Chins                        | KR | Republik Korea              | PT  | Portugal                    |     |                        | - |
| CU | Kuba                         | KZ | Kasachstan                  | RO  | Rumanien                    |     |                        |   |
| CZ | Tschechische Republik        | LC | St. Lucia                   | RU  | Russische Föderation        |     |                        |   |
| DE | Deutschland                  | LI | Liechtenstein               | SD  | Sudan                       |     |                        |   |
| DK | Dånemark                     | LK | - Sri Lanka                 | SE  | Schweden                    |     |                        |   |
| EE | Estland                      | LR | Liberia                     | SG  | Singapur                    |     |                        |   |

WO 98/08849 PCT/DE97/00111

# Verfahren zur Herstellung von Epothilonen und Zwischenprodukte innerhalb des Verfahrens

Die Erfindung betrifft Verfahren zur Herstellung von Epothilonen und Zwischenprodukte innerhalb des Verfahrens.

Epothilone 1 (DE 41 38 042 C2) stellen eine neue Klasse Tubulin-stabilisierender Naturstoffe mit Taxol-artiger Wirkung dar. Besonders ihre cytotoxische Wirkung gegenüber Arzneimittel-resistenten Tumorzellinien ist von enormer Bedeutung für eine potentielle Anwendung in der Krebstherapie [ G. Höfle, N. Bedorf, H. Steinmetz, D. Schomburg, K. Gerth, H. Reichenbach Angew. Chem. 1996, 108, 1671; Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1996, 35, 1567; D. Schinzer "Epothilones - New Promising Microtubule-stabilizing Natural Products with Taxol-like Biological Activity", Eur. Chem. Chron. 1996, 1, 7; D. M. Bollag, P. A. McQueney, J. Zhu, O. Hensens, L. Koupal, J. Liesch, M. Goetz, E. Lazarides, C. M. Woods, Cancer Res. 1995, 55, 2325].

Epothilone 1 (A: R = H, B: R = Me) wurden kürzlich aus Myxobakterien isoliert und sind über Fermentation zugänglich. Bedingt durch die sehr interessanten biologischen Eigenschaften ist die Synthese der Epothilone von größter Bedeutung. Gegenstand der Erfindung ist die Totalsynthese von Epothilon A und B 1.

WO 98/08849

2

Schema 1. Retrosynthetische Analyse,

[D. Schinzer, A. Limberg, O. M. Böhm, Chem. Eur. J. 1996, 2, 1477].

Epothilone 1 sind in konvergenter Reaktionsführung aus den drei Bausteinen 2, 3 und 4 zugänglich. Wie die Retrosynthese in Schema 1 zeigt, werden die Bausteine 2 und 3 in einer stereoselektiven Aldolreaktion verknüpft. Eine Veresterung mit Fragment 4 liefert das fast vollständig funktionalisierte Fragment 17, welches in einer Ringschlußmetathese zu Deoxy-epothilon A 19 cyclisiert wird. Eine abschließende Epoxydierung liefert schließlich 1. Der Schlüsselschritt in der Synthese ist die stereoselektive Aldolreaktion der Fragmente 2 und 3 (zugänglich aus der kommerziell erhältlichen Heptensäure). Unter kinetisch kontrollierten Reaktionsbedingungen in Gegenwart von LDA erhält man in 70% Ausbeute ausschließlich die gewünschte Verbindung 5 mit den vier korrekt plazierten Asymmetriezentren. Es kommt hier offensichtlich durch eine doppelte Stereodifferenzierung zu einer chiralen Übersteuerung der bevorzugten Cram-Selektivität des Aldehyds 3, da beide Reaktionspartner in optisch aktiver Form eingesetzt werden .

Die Erfindung betrifft also ein Verfahren zur Herstellung von Epitholon A oder B der allgemeinen Formel 1

worin R=Wasserstoff (A) oder eine Methylgruppe (B) bedeuten, wobei ein Thiazolalkyldien-alkohol-derivat der Formel 4

mit einer Carbonsäure der allgemeinen Formel 9a

worin B= Benzyl-, Tetrahydropyranyl- und/oder eine Silylschutzgruppe(n) und R=Wasserstoff oder Methyl

bedeuten.

verestert wird, der erhaltene Ester mittels einer Olefinmetathese in Gegenwart eines Edelmetallkatalysators ringgeschlossen, gegebenenfalls die Hydroxylschutzgruppen

gespalten werden, die neu entstandene Doppelbindung epoxidiert wird und gegebenenfalls die Hydroxylschutzgruppen gespalten werden.

Als Silylschutzgruppen B eignen sich in der Regel alle unterschiedlichen Trialkyloder Diaryl-alkyl-silylschutzgruppen, insbesondere die tert.-Butyl-dimethyl-, Trimethylsilyl- und Diphenyl-tert.-butyl-silylgruppen.

Die Dervate 4a und 9a werden verestert, vorzugsweise durch Anwendung von DCCI/DMAP und der so erhaltene Ester mit den zwei endständigen Alkengruppen wird durch Olefinmetathese, vorzugsweise durch Anwendung von RuCl<sub>2</sub>(=CHPh)(PCy<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (Grubbs-Katalysator) ringgeschlossen (J. Org. Chem. 1996, 61, 3942 - 3943; Tetrahedron 1996, 52, 7251 - 7264; J. Am. Chem. Soc., 1995, 117, 12364 - 12365; .J. Am. Chem. Soc., 1995, 117, 2943 - 2944 und Tetrahedron Lett.; 1994, 35, 3191 - 3194, J. Am. Chem. Soc., 1996, 118, 6634 - 6640 und J. Am. Chem. Soc., 1995, 118, 100 - 110.

Die Epoxidierung der neu entstandenen Doppelbindung erfolgt vorzugsweise mittels Persäure, z. B. Perchlorsäuresäure, oder Peroxid, z. B. Cumolhydroperoxid oder Dimethyldioxiran.

Weiter beinhaltet die Erfindung Desoxy-epothilone gemäß allgemeiner Formel 19a

worin B= Wasserstoff, Benzyl-, p-Methoxybenzyl-, Tetrahydropyranyl- und/oder eine Silylschutzgruppe(n) und R=Wasserstoff oder Methyl bedeuten, (2-(2,2-Dimethyl-[1,3]dioxan-4-yl)-2-methyl-pentan-3-on) 2, 2-Methyl-6-heptenal 3

und 2,6-Dimethyl-6-heptenal 3a,

und Verbindungen der allgemeinen Formel 9a

worin B= Benzyl-, Tetrahydropyranyl- und/oder eine Silylschutzgruppe(n) und R=Wasserstoff oder Methyl,

bedeuten,

und die Bedeutung von B im Molekül unterschiedlich sein kann, und Verbindungen der allgemeinen Formel 4a

worin

B=Wasserstoff, Benzyl-, p-Methoxybenzyl-, Tetrahydropyranyl- oder eine Silylschutzgruppe bedeutet und (4S,6S)-2-(2,2-dimethyl-[1,3] dioxan-4-yl)-5-hydroxy-

sowie Stereoisomere der beanspruchten Verbindungen.

Schema 2. a) LDA, THF, - 78 °C, 70%; b) Pyridinium-p-toluolsulfonat (PPTS), MeOH, RT, 36 h, 88%; c) 12 Äq. tBuMe<sub>2</sub>SiOTf (Tf = Trifluormethansulfonat), 6 Äq. 2,6-Lutidin, CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>, - 78 °C, 96%; d) 0.2 Äq. CSA (Camphersulfonsäure), MeOH, CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>, 0 °C, 5 h, 82%; e) 11 Äq. Pyridiniumdichromat (PDC), DMF, RT, 36 h, 79%.

Die Spaltung des Acetonids 5 zum Triol 6 gelingt glatt in Gegenwart von Pyridiniump-toluolsulfonat (PPTS). Eine sich anschließende Trisilylierung mit TBSOTf und
Lutidin als Hilfsbase liefert die gewünschte Verbindung 7. Um die Oxidation zur
Säure 9 zu ermöglichen, muß selektiv die primäre Silylgruppe abgespalten werden.
Dies gelingt glatt in Gegenwart von Camphersulfonsäure (CSA) und generiert
Verbindung 8. Eine abschließende Oxidation mit Pyridiniumdichromat (PDC)
produziert Fragment 9, welches die C1-C12-Untereinheit von 1 darstellt.

Schema 3. a) TBSCI, Imidazol, DMF, RT, 10 h; 98%; b) O<sub>3</sub>, PPh<sub>3</sub>, CH<sub>2</sub>CI<sub>2</sub>, -78 °C, 70%; c) 1.5 Äq. Diethyl (2-methylthiazol-4-yl)methanphosphonat, *n*BuLi, THF, -78 °C -> RT, 75%; d) HF, MeCN, einige Glassplitter, 0 °C, 87%; e) Dess-Martin-, Periodinan, CH<sub>2</sub>CI<sub>2</sub>, RT, 1 h, 78%; f) 1.85 Äq. PPh<sub>3</sub>MeBr/NaNH<sub>2</sub>, THF, RT, 20 min., 83%; g) 2.5 Äq. Tetrabutylammoniumfluord (TBAF), Molsieb 4 A, THF, -78 °C -> RT, 99%.

Der über eine Sharpless Resolution zugängliche (S)-Alkohol 10 [D. Schinzer, A. Limberg, O. M. Böhm, Chem. Eur. J. 1996, 2, 1477] wurde zunächst mit TBSCI silyliert, anschließend zum Methylketon 12 ozonisiert und in einer stereoselektiven Horner-Wadsworth-Emmons Reaktion zum tricyclischen Olefin 13 umgesetzt. Eine selektive Desilylierung mit HF in Acetonitril liefert Verbindung 14. Die Desilylierung zu 14 funktioniert nur in Gegenwart einiger Glassplitter; offensichtlich wird die Reaktion durch H2SiF6 katalysiert. Dess-Martin Oxidation, gefolgt von einer Wittig-

Olefinierung generiert Verbindung 16, die in einer abschließenden Desilylierung mit TBAF in THF Segment 4 liefert.

Die Veresterung der Bausteine 9 und 4 in Gegenwart von DCC und 4-DMAP erzeugt Verbindung 17, welche in stereochemisch homogener Form isoliert wird.

Epothilon C: 19

ŌН

Schema 4. a) 1.3 eq. Dicyclohexylcarbodiimid (DCC), 0.2 eq. 4-Dimethylaminopyridin (4-DMAP), CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>, RT, 12 h, 80%; b) Cl<sub>2</sub>[RuCHPh](PCy<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>, RT, 12 h, 94% (*Z*: *E* = 1:1); c) HF, MeCN, Et<sub>2</sub>O, RT, 12 h, 65%, d) Dimethyldioxiran, CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>, - 35 °C, 2 h, 48%.

Ringschlußmetathese mit  $Cl_2[RuCHPh](PCy_3)_2$  in  $CH_2Cl_2$  liefert 18 als Diastereomerengemisch (Z: E=1:1) in 94% Ausbeute. Den Abschluß der Totalsynthese bilden die Desilylierung mit HF in Acetonitril/Ether zu 19 und eine regio- und stereoselektive Epoxydierung mit Dimethyldioxiran zu 1. Das Hauptprodukt dieser Reaktion ist (-)-Epothilon A, das chromatographisch und spektroskopisch mit einer authetischen Probe identisch ist.

Insgesamt wurde eine streng konvergente Synthese beschrieben, welche viele Optionen zu Analoga offenhält, was im Hinblick auf die biologische Aktivität bedeutsam ist. Die gesamte Synthese kommt mit einem Schutzgruppentyp aus (TBS), welche in selektiven Reaktionen geknüpft oder abgespalten werden. Die stereoselektive Aldolreaktion ist hoch und stellt ein weiteres beeindruckendes Beispiel der chiralen Übersteuerung der Aldehydselektivität mit einem chiralen Enolat dar. Die Ringschlußmetathese zu 18 gelingt in 94% isolierter Ausbeute, liefert jedoch ein 1 : 1 Gemisch der Z- und E-Isomere. Das biologisch deutlich wirksamere Epothilon B 1 (R = Me) ist über den gleichen Herstellungsweg zugänglich.

### Herstellung von 2

#### Arbeitsvorschriften zur Synthese von Segment 2

(2-(2,2-Dimethyl-[1,3]dioxan-4-yl)-2-methyl-pentan-3-on)

[D. Schinzer, A. Limberg, O. M. Böhm, Chem. Eur. J. 1996, 2, 1477].

Das 3-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]propanal 42 wird ausgehend von Propan-1,3-diol 40 hergestellt, indem zunächst nach einer Methode von P.G. McDougal, J.G. Rico, Y. Oh, B.D. Condon, J. Org. Chem. 1986, 51, 3388-3390, zum 3-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]-1-propanol 41 monosilyliert wird, das anschließend mit DMSO/ Oxalylchlorid zum Aldehyd 42 oxidiert wird (A. Jenmalm, W. Berts, Y. Li, K. Luthmann, I. Csöregh, U. Hacksell, J. Org. Chem. 1994, 59, 1139-1148).

Darstellung von 1-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]-4,4-dimethyl-hex-5-en-3-ol 43 (H.C. Brown, P.K. Jadhav, Tetrahedron Lett. 1984, 25, 1215-1218; P.K. Jadhav, K.S. Bhat und P. Thirumalai, H.C. Brown, J. Org. Chem. 1986, 51, 432-439)

Zu einer auf -25°C gekühlten Suspension von Ipc2BH (7.34 mmol, hergestellt aus (-)- -Pinen [99 %, 97 %ee] H.C. Brown, M.C. Desai, P.K. Jadhav, J. Org. Chem. 1982, 47, 5065-5069; H.C. Brown, B. Singaram, J. Org. Chem. 1984, 49, 945-947) in 2.6 ml THF wird 500 mg (7.34 mmol, 1 equiv) 3-Methyl-1,2-butadien langsam zugetropft und die Reaktionsmischung 6 h bei -25°C gerührt. Das THF wird anschließend abgepumpt bei RT (14 mm Hg/1 h), (0.5 mm/2h) und der Rückstand in 10.5 ml Diethylether gelöst. Die Lösung wird auf -78°C gekühlt und 1.382 g (7.34 mmol, 1equiv) Aldehyd 42 zugetropft. Man löst 12 h bei -78°C rühren und läßt dann auf RT erwärmen. Die Reaktionmischung wird mit 10.7 ml 3 N NaOH-Lösung versetzt, danach mit 4.4 ml 30 %iger H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>-Lösung und 2 h unter Rückfluß erhitzt. Die organische Phase wird abgetrennt, mit 15 ml H<sub>2</sub>O und 15 ml ges. NaCl-Lösung gewaschen, Über MgSO<sub>4</sub> getrocknet und eingeengt. Der Rückstand wird säulenchromatographisch mit Pentan: Ether = 2:1 gereinigt und man erhält 800 mg (3.098mmol) des Alkohol 43, entsprechend einer Ausbeute von 42 %. Die Bestimmung des Enantiomerenüberschusses erfolgte durch GC-analytische Untersuchung der diastereomeren Verbindungen, die bei der Veresterung des Alkohols mit (1R)-(-)-Camphansäurechlorid erhalten werden und ergab einen ee-Wert von 92 %.

Allgemeine Daten:  $C_{14}H_{30}O_2Si$ , FG = 258.47 g/mol

13C-NMR (100 MHz, CDCl<sub>3</sub>): 145.69 (d), 112.27 (t), 78.52 (d), 63.29 (t), 41.19 (s), 33.39 (t), 25.89 (q), 22.85 (q), 22.43 (q), 18.17 (s), -5.52 (q)

# Darstellung von 4-(1,1-Dimethyl-allyl)-2,2-dimethyl-[1,3]dioxan 44

Es werden 278 mg (1.076 mmol) des Alkohols 43 in 13 ml Aceton gelöst und 200 mg (2.51 mmol, 2.3 eqiuv) wasserfreies CuSO<sub>4</sub> zugegeben. Dann werden 40 Tropfen einer Lösung von 0.1 ml Eisessig in 1 ml CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> zugetropft und 12 h bei RT gerührt. Falls sich DC-chromatographisch noch Edukt nachweisen läßt, wird weitere Säurelösung zugegeben, bis die Umsetzung vollständig ist. Zur Aufarbeitung wird das Reaktionsgemisch auf ges. NaHCO<sub>3</sub>-Lösung gegossen und die wässrige Phase mit DE extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden über MgSO<sub>4</sub> getrocknet und am Rotationsverdampfer eingeengt. Der Rückstand wird säulenchromatographisch mit Pentan:Ether = 2:1 gereinigt. Man erhält 161 mg (0.87 mmol) des Acetonids 44 entsprechend einer Ausbeute von 81 %.

Allgemeine Daten:  $C_{11}H_{20}O_2$ , FG = 184.28 g/mol 13C-NMR (100 MHz, CDCl<sub>3</sub>): 145.10 (d), 111.88 (t), 98.19 (s), 75.32 (d), 60.10 (t), 39.97 (s), 29.80 (q), 25.88 (t), 22.86 (q), 22.45 (q), 19.11 (q)

Darstellung von 2-(2,2-Dimethyl-[1,3]dioxan-4-yl)-2-methyl-propionaldehyd 45 Es werden 286 mg (1.55 mmol) des Acetonids 44 in 18 ml THF gelöst und 14 ml wässriger Phosphatpuffer pH 7 zugegeben. Zu der kräftig gerührten Reaktionmischung wird 400 µl (0.031 mmol, 0.02 equiv) OsO<sub>4</sub>-Lösung (2.5 %ig in tert-Butanol) zugetropft. Nach 10 Minuten werden 996 mg (4.656 mmol, 3 equiv) NalO<sub>4</sub> portionsweise über einen Zeitraum von 20 Minuten zugegeben. Die Mischung wird kräftig bei RT gerührt und nach 24 und 48 h jeweils weitere 332 mg (je 1.55 mmol, 2x1.0 equiv) NalO<sub>4</sub> addiert. Nach 55 h werden die Phasen getrennt, die wässrige Phase mit Ether extrahiert, die vereinigten organischen Phasen über MgSO<sub>4</sub> getrocknet und eingeengt. Der Rückstand wird säulenchromatographisch mit Pentan:DE = 1:1 gereingt. Man erhält 221 mg (1.19 mmol) des Aldehyds 45 entsprechend einer Ausbeute von 76 %.

Allgemeine Daten:  $C_{10}H_{18}O_3$ , FG = 186.25 g/mol 13C-NMR (100 MHz, CDCl<sub>3</sub>): 206.09 (d), 98.43 (s), 72.94 (d), 59.75 (t), 48.84 (s), 29.57 (q), 25.57 (t), 18.96 (q), 18.62 (q), 16.46 (q)

Darstellung von 2-(2,2-Dimethyl-[1,3]dioxan-4-yl)-2-methyl-pentan-3-ol 46 Eine Lösung von 268 mg (1.44 mmol) des Aldehyds 45 in 4 ml Diethylether wird bei 0 °C mit 528 μl (1.58 mmol, 1.1 equiv) einer 3 M Lösung von EtMgBr in Ether versetzt. Man läßt 2 h bei 0°C rühren, erwärmt auf RT und läßt eine weitere Stunde rühren. Zur Aufarbeitung wird mit ges. wässriger NH<sub>4</sub>Cl-Lösung versetzt und dann soviel Wasser zugegeben bis der Niederschlag in Lösung geht. Die wässrige Phase wird mit Ether extrahiert, die vereinigten organischen Phasen über MgSO<sub>4</sub> getrocknet und eingengt. Der Rückstand wird säulenchromatographisch mit Pentan:Ether = 1:1 gereinigt. Man erhält 251 mg (1.16 mmol) des Alkohols 46, entsprechend einer Ausbeute von 80 %.

Allgemeine Daten:  $C_{12}H_{24}O_3$ . FG = 216.31 g/mol 13C-NMR (100 MHz,  $C_6D_6$ ): 98.41 (s), 79.95 (d), 76.65 (d), 60.10 (t), 40.60 (s), Diastereomer 1: 30.04 (q), 25.73 (t), 24.64 (t), 20.03 (q), 19.25 (q), 15.99 (q), 11.67 (q) 13C-NMR (100 MHz,  $C_6D_6$ ): 98.57 (s), 78.85 (d), 76.46 (d), 60.08 (t), 39.93 (s), Diastereomer 2: 30.02 (q), 25.41 (t), 25.08 (t), 20.85 (q), 20.30 (q), 18.90 (q), 11.95 (q)

Darstellung von 2-(2,2-Dimethyl-[1,3]dioxan-4-yl)-2-methyl-pentan-3-on 2: W.P. Griffith, S.V. Ley, G.P. Whitcombe, A.D. White, *J. Chem. Soc.*, Chem. Commun. 1987, 1625-1627

Es werden 70 mg (0.32 mmol) des Alkohols 46 in 5 ml CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> gelöst und 6 4 Å Molsiebkugeln und 66 mg (0.48 mmol, 1.5 equiv) 4-Methylmorpholin N-oxid (NMO) zugegeben. Nach 10 Minuten Rühren werden 6 mg Tetrapropylammoniumperruthenoat(VII) (TPAP) (0.016 mmol, 0.05 equiv) addiert und 4 h bei RT gerührt. Danach wird die Reaktionsmischung am Rotationsverdampfer eingeengt und direkt säulenchromatographisch mit Pentan:Ether = 1:1 gereingt. Man erhält 60 mg (0.28 mmol) des Ethylketons 2, entsprechend einer Ausbeute von 86 %.

Allg meine Daten:  $C_{12}H_{22}O_3$ , FG = 214.30 g/mol 13C-NMR (100 MHz,  $C_6D_6$ ): 213.23 (s), 98.42 (s), 74.18 (d), 59.82 (t), 50.44 (s), 31.70 (t), 30.03 (q), 25.55 (t), 20.97 (q), 19.35 (q), 19.04 (q), 8.16 (q)

Synthese von 2-Methyl-6-heptenal 3 und 3a

Die Herstellung erfolgt in Anlehnung zur Synthese von 6-tert.Butyldimethylsilyloxy-2-methyl-hexanal <u>50</u> [D. Schinzer, A. Limberg, O. M. Böhm, *Chem. Eur. J.* **1996**, 2, 1477].

#### Arbeitsvorschriften zur Darstellung von Segment 3:

Das Natrium-6-hydroxyhexanoat wird nach einer Vorschrift von Wulff, Krüger und Röhle *Chem. Ber.* **1971**, *104*, 1387-1399 aus ω-Caprolacton hergestellt.

Darstellung von 6-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]-hexansäuresilylester
Eine Mischung aus 2.00 g (12.97 mmol) des Natrium-6-hydroxyhexanoats, 25 ml
DMF, 5.87 g (38.93 mmol, 3 equiv) TBDMSCl und 5.3 g (77.85 mmol, 6 equiv)
Imidazol wird 48 Stunden bei RT gerührt. Das Reaktionsgemisch wird flashfiltriert
und anschließend mit Pentan:DE = 4:1 säulen-chromatographisch gereingt. Man
erhält 3.99 g (11.1 mmol) der bissilylierten Verbindung 6-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]-hexansäuresilylester, entsprechend einer Ausbeute von 85 %.

Allgemeine Daten:  $C_{18}H_{40}O_{3}Si_{2}$ , FG = 360.69 g/mol 13C-NMR (100 MHz, CDCl<sub>3</sub>): 174.17 (s), 63.00 (t), 36.02 (t), 32.53 (t), 25.95 (q), 25.55 (q), 25.40 (t), 24.91 (t), 18.33 (s), 17.57 (s), -4.83 (q), -5.32 (q)

Darstellung von 6-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]-hexansäure

nach D.R. Morton, J.L. Thompson, *J. Org. Chem.* 1978, 43, 2102-2106. Eine Lösung von 3.25 g (9.02 mmol) der bissilylierten Verbindung 6-[(tert-Butyldimethyl-silyl)oxy]-hexansäuresilylester in 130 ml Methanol und 44 ml THF wird mit einer Lösung von 4.4 g (31.8 mmol, 3.5 equiv) K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> in 44 ml H<sub>2</sub>O versetzt und 1 h bei RT gerührt. Danach wird das Volumen der Reaktionslšsung im Vakuum auf ein Viertel reduziert. Man verdünnt mit 130 ml ges. NaCl-Lösung und stellt mit 1 \_ M KHSO<sub>4</sub>-Lösung auf pH 4-5 ein. Es wird mit Diethylether extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden über MgSO<sub>4</sub> getrocknet und das Lösungsmittel am Rotationsverdampfer abdestilliert. Man erhält 2.01 g (8.17 mmol) von 6-[(tert-

Rutvldimethvlsilvl)oxvl-hexansäure, entsprechend einer Ausbeute von 90 %.

Allgemeine Daten:  $C_{12}H_{26}O_3Si$ , FG = 246.42 g/mol 13C-NMR (100 MHz, CDCl<sub>3</sub>): 180.09 (s), 62.90 (t), 34.05 (t), 32.37 (t), 25.93 (q), 25.31 (t), 24.46 (t), 18.32 (s), -5.33 (q)

# Darstellung von 6-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]-hexanoylchlorid

J. Tanaka, Bull. Chem. Jpn. 1992, 65, 2851-2853.

Eine Lösung von 0.5 g (2.03 mmol) 6-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]-hexansäure in 4 ml Benzol wird mit 362 mg (3.04 mmol, 1.5 equiv) SOCl<sub>2</sub> versetzt und 2 h unter Rückfluß erhitzt. Man läßt abkühlen und destilliert das Lösungsmittel am Rotationsverdampfer ab. Um das überschüssige SOCl<sub>2</sub> aus der Reaktionsmischung zu entfernen, wird der Rückstand wieder mit Benzol versetzt und erneut abdestilliert. Man erhält 494 mg (1.865 mmol, 92%) des 6-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]-hexanoylchlorids. Dieses Rohprodukt wird ohne Aufreinigung und Charakterisierung weiter umgesetzt.

\*(S)-4-Isopropyl-3-propenoyl-oxazolidin-2-on 20

Darstellung in Anlehnung an: D. A. Evans, K. T. Chapman, J. Bisha *J. Am. Chèm. Soc.* 1988, 110, 1238; A. Studer, T. Hintermann, D. Seebach *Helv. Chim. Acta* 1995, 78, 1185. Zu einer Lösung von 1,299 g (10.0 mmol) (*S*)-4-Isopropyl-oxazolidin-2-on in 15 ml absolutem THF werden bei -78 °C langsam 6.88 ml einer 1,6M Lösung von *n*-BuLi in Hexan (11.0 mmol) gegeben. Man rührt die Lösung 30 min bei -78 °C, gibt tropfenweise 1,22 ml (15.0 mmol) Acrylsäurechlorid hinzu, läßt auf Raumtemperatur kommen und hydrolysiert mit 50 ml gesättigter NH4Cl-Lösung. Es wird dreimal mit je 50 ml Et<sub>2</sub>O extrahiert. Nach dem Trocknen über MgSO<sub>4</sub> wird das Lösungsmittel entfernt. Durch Flash-chromatographische Reinigung mit Pentan/Et<sub>2</sub>O (10:1) erhält man 1,63 g (8.9 mmol, 89%) <u>20</u>.

#### (S)-4-Isopropyl-3-(6-methylhept-6-enoyl)-oxazolidin-2-on 21a

Darstellung in Anlehnung an:

A. Studer, T. Hintermann, D. Seebach *Helv. Chim. Acta* 1995, *78*, 1185 47 mg (1.9 mmol) Mg-Drehspäne werden bei Raumtemperatur (bzw. unter gelegentlichem Erwärmen) in 1,5 ml absolutem THF mit 283 mg (1.9 mmol) 4-Brom-2-methyl-1-buten gerührt, bis alles Mg in Lösung gegangen ist. Diese Grignard-Lösung wird bei -30 °C mit einer Suspension von 197 mg (1.00 mmol) CuBr·Me<sub>2</sub>S in 1,5 ml absolutem THF versetzt. Man rührt 30 min bei dieser Temperatur, gibt 117 mg (0.64 mmol) 20 in 2 ml absolutem THF hinzu, rührt 16 h bei -10 °C und hydrolysiert mit 10 ml gesättigter NH<sub>4</sub>Cl-Lösung. Es wird dreimal mit je 20 ml Et<sub>2</sub>O extrahiert. Nach dem Trocknen über MgSO<sub>4</sub> wird das Lösungsmittel entfernt. Durch Flash-chromatographische Reinigung mit Pentan/Et<sub>2</sub>O (15:1) erhält man 128 mg (0.51 mmol, 79%) 21a

#### Hept-6-enoylchlorid

Eine Lösung von 2.58 g (20.13 mmol) Hept-6-ensäure in 10 ml CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> wird mit 5,11 g (40.26 mmol, 2 eq.) Oxalylchlorid versetzt, dann 1 h bei RT und 1h bei 40°C gerührt. Man läßt abkühlen und destilliert das Lösungsmittel bei 5 mbar ab. Man erhält 2.95 g (20.13 mmol, 100%) des Säurechlorids. Dieses Rohprodukt wird ohne weitere Aufreinigung umgesetzt.

Allgemeine Daten: C7H11ClO, FG = 146.62 g/mol

# (S)-3-Hept-6-enoyl-4-isopropyl-oxazolidin-2-on 21

$$0$$

$$0$$

$$0$$

$$0$$

$$21$$

A. Gonzalez, Synth. Comm. 1991, 21, 1353-1360

Eine Lösung von 2.08 g (16.10 mmol, 1 eq.) (4S)-4-Isopropyl-oxazolidin-2-on in 15 ml THF wird auf -78 °C gekühlt und tropfenweise mit 11.6 ml (18.52 mmol, 1.15 eq.) einer 1.6 M Lösung von n-BuLi-Lösung in Hexan versetzt. Anschließend wird bei -78 °C eine Lösung von 2.95 g (20.13 mmol, 1.25 eq.) Hept-6-enoylchlorid in 10 ml THF zugegeben. Man läßt auf RT erwärmen und gießt die Reaktionslösung auf gesättigte NaCl-Lösung. Die wäßrige Phase wird mit Ether extrahiert, die vereinigten organischen Phasen über MgSO4 getrocknet und das Lösungsmittel am Rotationsverdampfer abdestilliert. Der Rückstand wird säulen-chromatographisch mit PE: DE = 3: 1 gereinigt. Man erhält 3.55 g (14.82 mmol, 92%) des Oxazolidinons <u>21</u> als farbloses Öl.

Allgemeine Daten: C13H21NO3 , FG = 239.31 g/mol

(4S, 2'S)-4-Isopropyl-3-(2-methyl-hept-6-enoyl)-oxazolidin-2-on 22 analog Darst. 25 und (4S, 2'S)-4-Isopropyl-3-(2,6-dimethylhept-6-enoyl)-oxazolidin-2-on 22a

D.A. Evans, A.E. Weber J. Am. Chem. Soc. 1986, 108, 6757-6761
Es werden 9.02 ml (9.02 mmol, 1.15 equiv) einer 1 M Lösung von NaHMDS in THF auf -78°C gekühlt und tropfenweise mit einer auf 0°C gekühlten Lösung von 1.88 g (7.84 mmol) Oxazolidinon 21 in 8 ml THF versetzt. Man läßt 1 h bei -78°C rühren, addiert 5.57 g (39.22 mmol, 5 equiv) Mel gelöst in 2 ml THF und läßt für 4 h bei -78°C rühren. Anschließend wird mit ges. NH4Cl-Lösung gequencht, mit Diethylether

extrahiert, über MgSO<sub>4</sub> getrocknet und eingeengt. Der Rückstand wird säulenchromatographisch mit PE: DE = 4:1 gereinigt. Man erhält 1.51 g (5.96 mmol, 76%) der methylierten Verbindung <u>22</u>.

Allgemeine Daten: C<sub>14</sub>H<sub>23</sub>NO<sub>3</sub>, FG = 253.34 g/mol Verbindung <u>22a</u> wird analog hergestellt. Aus 2,03 g (8.0 mmol) <u>21a</u> erhält man 1,56 g (5.84 mmol, 73%) <u>22a</u>.

#### (S)-2-Methyl-hept-6-en-1-ol 23 und

#### (S)-2,6-Dimethylhept-6-en-1-ol 23a

D.A. Evans, A.E. Weber *J. Am. Chem. Soc.* **1986**, *108*, 6757-6761

Zu einer auf 0°C gekühlten Lösung von 738 mg (2.91 mmol) der methylierten

Verbindung <u>22</u> in 10 ml Diethylether werden langsam 5.83 ml (5.83 mmol, 2 eq.)

einer 1 M Suspension von LAH in Diethylether zugegeben. Es wird gequencht durch
die Zugabe von 221 ml Wasser, 221 ml 15%iger wässriger NaOH-Lösung und 663
ml Wasser. Anschließend wird über Celite mit Diethylether flashfiltriert und
säulenchromatographisch mit Pentan: DE = 3:1 gereinigt. Man erhält 299 mg (2.33
mmol, 80%) des Alkohols <u>23</u> als farblose Flüssigkeit.

Allgemeine Daten: C<sub>8</sub>H<sub>16</sub>O, FG = 128.21 g/mol Verbindung <u>23a</u> wird analog hergestellt. Aus 748 mg (2.80 mmol) <u>22a</u> erhält man 331 mg (2.32 mmol, 83%) <u>23a</u>.

## (S)-2-Methyl-hept-6-enal 3 und (S)-2,6-Dimethylhept-6-enal 3a

Eine Lösung von 295 mg Alkohol 23 (2.30 mmol) in 5 ml CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> wird mit 1.269 g (2.99 mmol, 1.3 eq.) Dess-Martin-Periodinan (1,1,1-Triacetoxy-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3(1*H*)-on) versetzt und 25 Minuten bei RT gerührt. Zur Aufarbeitung wird ein Volumenequivalent Phosphatpuffer pH 7 zugegeben. Die wäßrige Phase wird mit CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> extrahiert. die vereinigten organischen Phasen über MgSO<sub>4</sub>

getrocknet und das Lösungsmittel am Rotationsverdampfer abdestilliert. Der Rückstand wird säulen-chromatographisch mit Pentan: DE = 10:1 gereinigt. Man erhält 224 mg (1.77 mmol, 77%) des Aldehyds als farblose Flüssigkeit. Allgemeine Daten: C8H14O, FG = 126.20 g/mol

Verbindung <u>3a</u> wird analog hergestellt. Aus 284 mg (2.00 mmol) <u>23a</u> erhält man 199 mg (1.42 mmol, 71%) <u>3a</u>

### Herstellung von 4:

#### Synthes von Segment 4:

### 3-[(t-Butyldimethylsilyl)oxy]-propanal

Synthese durch Monosilylierung von 1,3-Propandiol und anschließende Swern-Oxidation des entstandenen 3-[(t-Butyldimethylsilyl)oxy]-1-propanols.

Allgemeine Daten:  $C_9H_{20}O_2Si$ ; FG=188.36; CAS-Nr. [89922-82-7] 13C-NMR (100 MHz, CDCl<sub>3</sub>): d=202.05 (d), 57.42 (t), 46.58 (t), 25.82 (q), 18.23 (s), -5.43 (q)

### 1-[(t-Butyldimethylsilyl)oxy]-3-hydroxy-4-methyl-4-penten 10

Zu 443 mg Mg-Drehspänen (18.2 mmol) und 1.5 ml abs. THF unter N<sub>2</sub> werden 0.2 ml 2-Brompropen gegeben, so daß die Reaktion anspringt. Es wird unter gelegentlicher Kühlung eine Lösung von 1.7 ml 2-Brompropen (insgesamt 22 mmol) in 6 ml abs. THF langsam zugetropft, bis alle Mg-Späne gelšst sind. Zu der noch warmen Mischung wird eine Lösung von 2.862 g 1 (15.2 mmol) in 6 ml abs. THF getropft. Es wird 6 h bei RT gerührt. Danach gibt man 25 ml ges. NH<sub>4</sub>Cl-Lsg. zu der Reaktionslösung und läßt 10 Min. rühren. Die Mischung wird in 30 ml ges. NH<sub>4</sub>Cl-Lsg. gegossen und zweimal mit Ether extrahiert. Die vereinigten org. Phasen werden je einmal mit ges. NH<sub>4</sub>Cl-Lsg. und ges. NaCl-Lsg. gewaschen. Man trocknet über MgSO<sub>4</sub>, engt im Vakuum ein und reinigt flashchromatographisch (Ether:Pentan = 1:6).

Man erhält 2.749 g 2 (11.9 mmol; 79% d. Th.) als farbloses Öl.

Allgemeine Daten: C<sub>12</sub>H<sub>26</sub>O<sub>2</sub>Si; FG=230.43 <sup>13</sup>C-NMR (100 MHz, CDCl<sub>3</sub>): d=147.10 (s), 110.39 (t), 75.21 (d), 62.17 (t), 36.79 (t), 25.89 (q), 18.41 (s), -5.49 (q), -5.53 (q) 23

# (S)-1,3-Di-[(tert-Butyldimethylsilyloxy)]-4-methyl-4-penten 11

Zu einer Lösung von 1,173 g (4.83 mmol) (*S*)-1-[(*tert*-Butyldimethylsilyloxy)]-4-methyl-4-penten-3-ol **10** und 855 mg (12.56 mmol, 2.6 eq) Imidazol in 15,0 ml absolutem DMF werden 946 mg (6.28 mmol, 1.3 eq) *tert*-Butyldimethylchlorsilan gegeben. Die Mischung wird 16 h bei Raumtemperatur gerührt. Man versetzt mit 50 ml einer wäßrigen 1M KHSO4-Lösung und extrahiert viermal mit je 50 ml Et<sub>2</sub>O . Die vereinigten Etherextrakte werden über MgSO4 getrocknet. Nach Abdestillieren des Lösungsmittels im Vakuum wird der Rückstand durch eine Kieselgel-Säule mit Pentan/Et<sub>2</sub>O (20:1) flash-chromatographiert. Alternativ zu dieser wäßrigen Aufarbeitung kann die Reaktionsmischung unmittelbar chromatographiert werden. Nach beiden Aufarbeitungsvarianten erhält man 1,643 g (4.73 mmol, 98%) <u>11</u>.

# (S)-3,5-Di-[(tert-Butyldimethylsilyloxy)]-pentan-2-on 12

Ozon in O2 wird bei -78 °C durch eine Lösung von 1,610 g (4.67 mmol) 11 in 200 ml absolutem Dichlormethan geleitet (Trockeneis/Aceton-Kältebad). Wenn dünnschichtchromatographisch in der Lösung Ausgangsverbindung 11 nicht mehr nachzuweisen ist, werden 3,89 g (14.83 mmol) Triphenylphosphin hinzugefügt, und das Kältebad wird entfernt. Man läßt den Reaktionsansatz langsam auf Raumtemperatur kommen und destilliert das Lösungsmittel im Vakuum ab. Flash-Chromatographie des Rückstandes durch eine Kieselgel-Säule mit Pentan/ Et<sub>2</sub>O (50:1) liefert 1,135 g (3.27 mmol, 70%) 12.

#### Diethyl-(2-methylthiazol-4-yl)-methanphosphonat

Die Herstellung erfolgt ausgehend vom literaturbekannten 4-Chlormethyl-2-methylthiazol analog der Vorschrift für 4-Brommethyl-2-methylthiazol. Aus 7,381 g (50 mmol) 4-Chlor-methyl-2-methylthiazol erhält man 9,971 g (40 mmol, 80%) Diethyl-(2-methylthiazol-4-yl)-methanphosphonat.

(S,4E)-4-[3,5-Di-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-methyl-pent-1-enyl]-2-methyl-thiazol 13

Zu einer Lösung von 1,170 g (4.70 mmol) Diethyl-(2-methylthiazol-4-yl)-methanphosphonat in 15 ml absolutem THF werden bei -78 °C 2,94 ml *n*-BuLi (1,6 m Lösung in Hexan) getropft. Man läßt 45 min bei -78 °C rühren und tropft dann langsam eine Lösung von 1,135 g (3.27 mmol) 12 in 10 ml absolutem THF zu, läßt auf Raumtemperatur erwärmen und rührt noch 12 h bei Raumtemperatur. Die Reaktionsmischung wird mit 100 ml gesättigter NH4Cl-Lösung versetzt und viermal mit je 80 ml Et<sub>2</sub>O extrahiert. Die vereinigten Etherextrakte werden mit gesättigter NaCl-Lösung gewaschen und über MgSO4 getrocknet. Nach Abdestillieren des Lösungsmittels im Vakuum wird der Rückstand durch eine Kieselgel-Säule mit Pentan/ Dichlormethan (2:3) flash-chromatographiert. Man erhält 1,090 g (2.47 mmol, 75%) 13

(S,4E)-3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-4-methyl-5-(2-methyl-thiazol-4-yl)-pent-4-en-1-ol 14

Eine Lösung von 442 mg (1.0 mmol) 13 in 40 ml Acetonitril wird bei -20 °C tropfenweise mit 0,45 ml Fluorwasserstoffsäure (40 %) versetzt. Nach Zugabe von einigen Glassplittern bzw. 0,045 ml Hexafluorokieselsäure (30 %) rührt man bei 0 °C, bis dünnschichtchromatographisch in der Lösung Ausgangsverbindung 13 nicht mehr nachzuweisen ist. Die Reaktionsmischung wird mit 50 ml gesättigter NaHCO3-Lösung versetzt und viermal mit je 80 ml Et<sub>2</sub>O extrahiert. Die vereinigten Etherextrakte werden über MgSO4 getrocknet. Nach Abdestillieren des Lösungsmittels im Vakuum wird der Rückstand durch eine Kieselgel-Säule mit Et<sub>2</sub>O flash-chromatographiert. Man erhält 284 mg (0.87 mmol, 87%) 14

(S,4E)-3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-4-methyl-5-(2-methyl-thiazol-4-yl)-pent-4-enal 15

Eine Suspension von 478 mg (1.127 mmol, 1.3 eq) Dess-Martin-Periodinan (1,1,1-Triacetoxy-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3(1*H*)-on) in 5,6 ml absolutem CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> wird mit einer Lösung von 284 mg (0.87 mmol) <u>14</u> in 5,0 ml absolutem CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> versetzt und 60 min bei Raumtemperatur gerührt. Nach Abdestillieren des Lösungs-mittels im Vakuum wird der Rückstand durch eine Kieselgel-Säule mit Pentan/Et<sub>2</sub>O (4:1) flash-chromatographiert. Man erhält 222 mg (0.68 mmol, 78%) <u>15</u>.

(S,4E)-4-[3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-methyl-hexa-1,5-dienyl]-2-methyl-thiazol 16

440 mg (1.06 mmol, 1.85 eq) einer Mischung äquimolarer Mengen von Natriumamid und Methyltriphenylphosphoniumbromid werden 30 min bei Raumtemperatur in 4,0 ml absolutem THF gerührt. Man fügt eine Lösung von 185 mg (0.57 mmol) <u>15</u> in 5,0 ml absolutem THF hinzu, rührt noch 20 min, versetzt mit 20 ml gesättigter NaHCO3-Lösung und extrahiert viermal mit je 30 ml Et<sub>2</sub>O. Die vereinigten Etherextrakte werden über MgSO4 getrocknet. Nach Abdestillieren des Lösungsmittels im Vakuum wird der Rückstand durch eine Kieselgel-Säule mit Pentan/Et<sub>2</sub>O (20:1) flash-chromatographiert. Man erhält 151 mg (0.47 mmol, 83%) <u>16</u>.

2-Methyl-1-(2-methyl-thiazol-4-yl)-hexa-1,5-dien-3-ol 4

1,18 ml (1.18 mmol, 2.5 eq) einer 1M TBAF-Lösung in THF werden in 10 ml absolutem THF 20 min mit aktiviertem Molsieb 4Å bei Raumtemperatur gerührt, üm restliches Wasser der TBAF-Lösung zu binden. Zu der resultierenden wasserfreien TBAF-Lösung wird bei -78 °C tropfenweise eine Lösung von 151 mg (0.47 mmol) 16 gegeben. Man läßt langsam unter Rühren auf Raumtemperatur erwärmen und hydrolysiert mit 50 ml gesättigter NH4Cl-Lösung, wenn dünnschichtchromatographisch in der Lösung Ausgangsverbindung 16 nicht mehr nachzuweisen ist. Es wird dreimal mit je 50 ml Et<sub>2</sub>O extrahiert. Nach dem Trocknen über MgSO<sub>4</sub> wird das Lösungsmittel entfernt. Durch Flash-chromatographische Reinigung mit Pentan/Et<sub>2</sub>O (20:1)erhält man 97 mg (0.465 mmol, 99%) 4.

Die Darstellungen von Verbindungen der allgemeinen Formel 4a

(B steht für Benzyl-, p-Methoxybenzyl-, Tetrahydropyranyl- oder eine Silylschutzgruppe; z. B. Trialkyl- oder Diaryl-alkyl-silylschutzgruppen, insbesondere tert.-Butyl-dimethyl-, Trimethylsilyl- und Diphenyl-tert.-butyl-silylgruppen) erfolgt aus

durch Anwendung konventioneller Schutzgruppentechnik der Veretherung, siehe auch (D. Schinzer, A. Limberg, O. M. Böhm, *Chem. Eur. J.* 1996, *2*, 1477).

Darstellung von 5 und Verbindungen der allgemeinen Formel 9a (4'S,4R,5S,6S)-2-(2,2-Dimethyl-[1,3]dioxan-4-yl)-5-hydroxy-2,4,6-trimethyl-undec-10-en-3-on 5 und (4'S,4R,5S,6S)-2-(2,2-dimethyl-[1,3]dioxan-4-yl)-5-hydroxy-2,4,6,10-tetramethyl-undec-10-en-3-on 5a analog Schema 2.

C. H. Heathcock, C. T. Buse, W. A. Kleschick, M. C. Pirrung, J. E. Sohn, J. Lampe J. Org. Chem. 1980, 45, 1066

Zu einer Lösung von 153 mg (1.509 mmol, 0.98 eq.) in 1.5 ml THF werden bei 0°C 943 Mikroliter (1.509 mmol, 0.98 eq.) einer 1.6 M Lösung von n-BuLi in Hexan

getropft und 30 Minuten gerührt, bevor dann auf -78°C heruntergekühlt wird. Nun werden 330 mg (1.540 mmol, 1 eq.) (S)-2-(2,2-Dimethyl-[1,3]dioxan-4-yl)-2-methyl-pentan-3-on 2, gelöst in 1 ml THF langsam zugetropft. Die Lösung wird 1 h bei - 78°C gerührt. Anschließend werden 194 mg (1.540 mmol, 1eq.) (S)-2-Methyl-hept-6-enal 3 zugetropft und 45 Minuten bei -78°C gerührt. Die Reaktionslösung wird durch Zugabe von gesättigter NH4Cl-Lösung gequencht und auf RT erwärmt. Die wäßrige Phase wird mit Ether extrahiert, die vereinigten organischen Phasen werden über MgSO4 getrocknet und das Lösungsmittel am Rotationsverdampfer abdestilliert. Der Rückstand wird säulenchromatographisch mit Pentan: Diethylether = 3:1 gereinigt. Man erhält 369 mg (1.084 mmol, 70%) des Aldolprodukts 5 als farbloses Öl. Allgemeine Daten: C20H36O4. FG = 340.50 g/mol Verbindung 5a wird analog hergestellt. Aus 238 mg (1.70 mmol) 3a erhält man 386 mg (1.09 mmol, 64%) 5a.

(3S, 6R, 7S, 8S)-1,3,7-Trihydroxy-4,4,6,8-tetramethyl-tridec-12-en-5-on 6 und (3S, 6R, 7S, 8S)-1,3,7-Trihydroxy-4,4,6,8,12-pentamethyl-tridec-12-en-5-on 6a

L. A. Paquette, D. R. Sauer, D. G. Cleary, M. A. Kinsella, C. M. Blackwell, L. G. Anderson J. Am. Chem. Soc. 1992, 114, 7375-7387. Eine Lösung von 100 mg ~ (0.294 mmol) des Aldolprodukts 5 in 14 ml MeOH wird mit 95 mg (0.378 mmol, 1.3 eq.) PPTS versetzt, 36 h bei RT gerührt und dann durch die Zugabe von 33 Tropfen gesättigter NaHCO3-Lösung gequencht. Die Mischung wird am Rotationsverdampfer eingeengt und der Rückstand in Ether aufgenommen. Es wird mit gesättigter NaCl-Lösung gewaschen und die wäßrige Phase mit Ether extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden über MgSO4 getrocknet und das Lösungsmittel am Rotationsverdampfer abdestilliert. Der Rückstand wird säulenchromatographisch mit Diethylether gereinigt. Man erhält 78 mg (0.260 mmol, 88%) des Triols 6 als farbloses Öl.

Allgemeine Daten: C<sub>17</sub>H<sub>32</sub>O<sub>4</sub>, FG = 300.44 g/mol Verbindung <u>6a</u> wird analog hergestellt. Aus 96 mg (0.270 mmol) <u>5a</u> erhält man 77 mg (0.246 mmol, 91%) <u>6a</u>.

(3S, 6R, 7S, 8S)-1,3,7-Tri-(*tert*-Butyldimethylsilyloxy)-4,4,6,8-tetramethyl-tridec-12-en-5-on <u>7</u> und (3S, 6R, 7S, 8S)-1,3,7-Tri-(*tert*-Butyldimethyl-silyloxy)-4,4,6,8,12-pentamethyl-tridec-12-en-5-on <u>7a</u>

Yuanwei Chen, Pierre Vogel, J. Org. Chem. 1994, 59, 2487-2496

Zu einer auf -78°C gekühlten Lösung von 225 mg (0.749mmol) des Triols <u>6</u> in 13 ml CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> werden langsam 963 mg (8.99 mmol, 12 eq.) 2.6-Lutidin und 1188 mg (4.49 mmol, 6eq.) *tert*-Butyldimethylsilyltrifluormethansulfonat zugetropft. Man läßt 30 Minuten bei -78°C und 3 h bei 0°C rühren und quencht mit gesättigter NaHCO3-Lösung. Die wäßrige Phase wird mit CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden über MgSO4 getrocknet und das Lösungsmittel am Rotationsverdampfer abdestilliert. Der Rückstand wird säulenchromatographisch mit Pentan: Diethylether = 30:1 gereinigt. Man erhält 462 mg (0.719 mmol, 96%) des trisilylierten Produkts <u>7</u> als farbloses Öl.

Allgemeine Daten: C35H74O4Si3, FG = 643.22 g/mol

Verbindung 7a wird analog hergestellt. Aus 204 mg (0.650 mmol) 6a erhält man 423 mg (0.644 mmol, 99%) 7a.

(3S, 6R, 7S, 8S)-3,7-DI-(*tert*-Butyldimethylsilyloxy)-1-hydroxy-4,4,6,8-tetramethyl-tridec-12-en-5-on <u>8</u> und (3S, 6R, 7S, 8S)-3,7-DI-(*tert*-Butyldimethylsilyloxy)-1-hydroxy-4,4,6,8,12-penta-methyl-tridec-12-en-5-on 8a

K. C. Nicolaou, K. R. Reddy, G. Skokotas, F. Sato, X.-Y. Xiao

J. Am. Chem. Soc. 1992, 114, 7935. Eine Lösung von 156 mg (0.243 mmol) der trisilylierten Verbindung Z in 6.5 ml MeOH und 6.5 ml CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> wird auf 0°C gekühlt und es werden 11 mg Camphersulfonsäure (0.0485 mmol, 0.2 eq.) addiert. Nach 5 h Rühren bei 0°C wird durch die Zugabe von gesättigter NaHCO<sub>3</sub>-Lösung gequencht. Die wäßrige Phase wird mit CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden über MgSO<sub>4</sub> getrocknet und das Lösungsmittel am Rotationsverdampfer destilliert. Der Rückstand wird säulenchromatographisch mit Pentan: Diethylether = 3:1 gereinigt. Man erhält 105 mg (0.199 mmol, 82%) des Alkohols 8 als farbloses Öl.

Allgemeine Daten: C<sub>29</sub>H<sub>60</sub>O<sub>4</sub>Si<sub>2</sub> , FG = 528.96 g/mol Verbindung <u>8a</u> wird analog hergestellt. Aus 152 mg (0.232 mmol) <u>7a</u> erhält man 101 mg (0.186 mmol, 80%) <u>8a</u>

(3S,6R,7S,8S)-3,7-Di-(*tert*-Butyldimethylsilyloxy)-4,4,6,8-tetramethyl-5-oxo-tridec-12-ensäure <u>9</u> und (3S,6R,7S,8S)-3,7-Di-(*tert*-Butyldimethylsilyloxy)-4,4,6,8,12-pentamethyl-5-oxo-tridec-12-ensäure <u>9a</u>

E. J. Corey, G. Schmidt, Tetrahedron Lett. 1979, 399-402

Zu einer Lösung von 303 mg (0.573 mmol) Alkohol 8 in 6 ml DMF werden bei 0°C 2371 mg (6.30 mmol, 11eq.) PDC gelöst in 3 ml DMF zugetropft. Man läßt 36 h bei RT rühren und gießt dann in 50 ml gesättigte NaCl-Lösung, verdünnt mit Wasser und extrahiert mit CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>. Die vereinigten organischen Phasen werden über MgSO<sub>4</sub> getrocknet und das Lösungsmittel am Rotationsverdampfer abdestilliert. Der

Rückstand wird säulenchromato-graphisch mit Pentan: Diethylether = 2:1 gereinigt. Man rhält 247 mg (0.455 mmol, 79%) der Säure <u>9</u> als farbloses Öl. Allgemeine Daten: C29H58O5Si2, FG = 542.94 g/mol, Verbindung <u>9a</u> wird analog hergestellt. Aus 320 mg (0.590 mmol) <u>8a</u> erhält man 273 mg (0.490 mmol, 83%) <u>9a</u>.

(3*S*,6*R*,7*S*,8*S*)-3,7-Di-*tert*-Butyldimethylsilyloxy-4,4,6,8-tetramethyl-5-oxo-tridec-12-ensäure-(1*S*)-1-[(*E*)-1-methyl-2-(2-methyl-thiazol-4-yl)-vinyl]-but-3-enyl-ester <u>und</u>

\*(3S,6R,7S,8S)-3,7-Di-*tert*-Butyldimethylsilyloxy-4,4,6,8,12-penta-methyl-5-oxotridec-12-ensäure-(1S)-1-[(E)-1-methyl-2-(2-methyl-thiazol-4-yl)-vinyl]-but-3-enyl-ester <u>17a</u>

Veresterung nach B. Neises, W. Steglich *Angew. Chem.* **1978**, *90*, 556. Eine Lösung von 145 mg (0.268 mmol) Säure <u>9</u>, 56 mg (0.268 mmol) Alkohol <u>4</u> und 6,5 g (0.0536 mmol, 0.2 eq) DMAP in 1,5 ml absolutem CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> wird bei 0 °C mit 72 mg (0.348 mmol, 1.3 eq) Dicyclohexylcarbodiimid versetzt. Man rührt 10 min bei 0 °C und 12 h bei Raumtemperatur. Nach Entfernen des Lösungsmittels und Flash-Chromatographie des Rückstandes mit Pentan/Et<sub>2</sub>O (20:1) werden 157 mg (0.214 mmol, 80%) des Esters <u>17</u> erhalten.

\* Die Darstellung von Ester <u>17a</u> erfolgt analog. Aus 167 mg (0.30 mmol) <u>9a</u> und der äquimolaren Menge <u>4</u> erhält man 166 mg (0.222 mmol, 74%) <u>17a</u> .

(4S,7R,8S,9S,16S,13Z)-4,8-Di-*tert*-Butyldimethylsilyloxy-5,5,7,9-tetra-methyl-16-[(*E*)-1-methyl-2-(2-methyl-thiazoi-4-yl)-vinyl]-1-oxa-cyclohexadec-13-en-2,6-dlon und

\*(4S,7R,8S,9S,16S,13Z)-4,8-Di-*tert*-Butyldimethylsilyloxy-5,5,7,9,13-pentamethyl-16-[(E)-1-methyl-2-(2-methyl-thiazol-4-yl)-vinyl]-1-oxa-cyclohexadec-13-en-2,6-dion <u>18a</u>

Eine Ar-gesättigte Lösung von 49,3 mg (0.0671 mmol) des Esters 17 in 33,5 ml absolutem CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> (entsprechend einer Substratkonzentration von 0.002 M) wird mit mit 3,3 mg (6 mol-%) Cl<sub>2</sub>[Ru=CHPh](PCy<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (Cy=Cyclohexyl) 16 h unter einer Argon-Atmosphäre gerührt. Nach Entfernen des Lösungsmittels und Flash-Chromatographie des Rückstandes mit Pentan/Et<sub>2</sub>O (20:1) werden 44 mg (0.0630 mmol, 94%) der Verbindung 18 als 1:1- Gemisch mit seinem *E*-Isomeren erhalten. \* 49,0 mg (0.068 mmol, 68%) eines Gemisches aus 18a und seinem *E*-Isomeren werden analog aus 74,8 mg (0.100 mmol) 17a erhalten.

(4S,7R,8S,9S,16S,1Z)-4,8-Dihydroxy-5,5,7,9-tetra-methyl-16-[(E)-1-methyl-2-(2-methyl-thiazol-4-yl)-vinyl]-1-oxa-cyclohexadec-13-en-2,6-dion 19 ("Epothilon C") und

\*(4S,7R,8S,9S,16S,13Z)-4,8-Dihydroxy-5,5,7,9,13-penta-methyl-16-[(E)-1-methyl-2-(2-methyl-thiazol-4-yl)-vinyl]-1-oxa-cyclohexadec-13-en-2,6-dion 19a ("Epothilon D")

Eine Lösung von 35,3 mg (0.05 mmol) <u>18</u> (Z.E-Gemisch 1:1) in 2,4 ml Acetonitril/Et<sub>2</sub>O (1:1) wird bei 0 °C tropfenweise mit 0,27 ml Fluorwasserstoffsäure (40 %) versetzt. Nach Zugabe von einigen Glassplittern bzw. 0,027 ml Hexafluorokieselsäure (30 %) rührt man 17 h bei Raumtemperatur. Die Reaktionsmischung wird mit 10 ml gesättigter NaHCO3-Lösung versetzt und dreimal mit je 20 ml Et<sub>2</sub>O extrahiert. Die vereinigten Etherextrakte werden über MgSO4 getrocknet. Nach Abdestillieren des Lösungsmittels im Vakuum wird der Rückstand durch eine Kieselgel-Säule mit Et<sub>2</sub>O flash-chromatographiert. Man erhält 16,5 mg (0.0325 mmol, 65%) 19 als 1:1-Z:E-Gemisch.

\* 20,7 mg (0.042 mmol, 70%) 19a (als Z:E-Gemisch) werden analog aus 43,2 mg (0.06 mmol) 18a erhalten.

### Epothilon A 1 und \*Epothilon B 1a

Eine Lösung von 14,3 mg (0.03 mmol) 19 (1:1-Z:E-Gemisch) in 2,5 ml CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> wird bei

-35 °C unter Rühren tropfenweise mit 0,36 ml (0.035 mmol, 1.2 eq) einer frisch hergestellten Lösung von Dimethyldioxiran in Aceton versetzt. Man rührt 2 h bei -35 °C, versetzt dann mit 5 ml einer 10%igen wäßrigen Lösung von Eisen(II)-sulfat und extrahiert dreimal mit je 10 ml CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>. Nach Abdestillieren des Lösungsmittels im Vakuum wird der Rückstand durch eine Kieselgel-Säule mit Et<sub>2</sub>O flash-chromatographiert. Man erhält 7,1 mg (0.0144 mmol, 48%) Epothilon A. \* 6,2 mg (0.0123 mmol, 41%) Epothilon B werden analog aus 14,8 mg (0.03 mmol) 19a erhalten.

Die Erfindung betrifft auch Stereoisomere der Verbindungen gemäß der Ansprüche, wie diese üblicherweise innerhalb der Synthese anfallen.

#### Patentansprüche

1.) Verfahren zur Herstellung von Epitholon A oder B der allgemeinen Formel 1

$$C 12/13 C = C$$
 $D 12/13 C = C$ 
 $E 24-0H$ 
 $F 24-0H$ 
 $N$ 
 $N$ 
 $O OH O$ 
 $O OH O$ 

worin R=Wasserstoff (A) oder eine Methylgruppe (B) bedeuten, addurch gekennzeichnet, daß ein Thiazolalkyldien-alkohol-derivat der Formel 4

mit einer Carbonsäure der allgemeinen Formel 9a

worin B= Benzyl-, Tetrahydropyranyl- und/oder eine Silylschutzgruppe(n) und R=Wasserstoff oder Methyl bedeuten,

verestert wird, der erhaltene Ester mittels einer Olefinmetathese in Gegenwart eines Edelmetallkatalysators ringgeschlossen, gegebenenfalls die Hydroxylschutzgruppen gespalten werden, die neu entstandene Doppelbindung epoxidiert wird und gegebenenfalls die Hydroxylschutzgruppen gespalten werden.

2.) Desoxy-epothilone gemäß allgemeiner Formel 19a

worin B= Wasserstoff, Benzyl-, p-Methoxybenzyl-, Tetrahydropyranyl- und/oder eine Silylschutzgruppe(n) und R=Wasserstoff oder Methyl bedeuten,

- 3.) 2-(2,2-Dimethyl-[1,3]dioxan-4-yl)-2-methyl-pentan-3-on 2
- 4.) 2-Methyl-6-heptenal 3

#### 5.) 2,6-Dimethyl-6-heptenal 3a

### 6.) Verbindungen der allgemeinen Formel 9a

worin B= Benzyl-, Tetrahydropyranyl- und/oder eine Silylschutzgruppe(n) und R=Wasserstoff oder Methyl, bedeuten, und die Bedeutung von B im Molekül unterschiedlich sein kann.

#### 7.) Verbindungen der allgemeinen Formel 4a

worin

B=Wasserstoff, Benzyl-, p-Methoxybenzyl-, Tetrahydropyranyl- oder eine Silylschutzgruppe bedeutet.

- 8.) (4S,6S)-2-(2,2-dimethyl-[1,3] dioxan-4-yl)-5-hydroxy-2,4,6-trimethyl-undecan-3-on <u>5</u>
- 9.) Stereoisomere der Verbindungen gemäß Ansprüche 1 6.

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT International Application No

PCT/DE 97/00111

|             |  | 701/00 37/00111  |                  |
|-------------|--|--|------------------|
| CLASSIF     | CO7D493/04 CO7C47/21 CO7D31  | 9/06 C07D277/24 C07C59/01  |                  |
|             | A control of the cont | missing and IRC  | `                |
|             | International Patent Classification (IPC) or to both national classification ( | succession and ir C  |                  |
|             | SEARCHED  CUMENTATION SEAFCHED (CLASSIFICATION SYSTEM followed by CLASSIFICATION SYSTEM followed by CLASSIFICATION SYSTEM FOR STATEMENT OF THE | cation symbols   |                  |
| PC 6        | C07D   | •  |                  |
| ocumenta    | on searched other than minimum discumentation to the extent th   | at such documents are included in the fields searched  |                  |
|             |  |  |                  |
| ectronic da | ers pare consulted diming the international server iname of data   | base and, where practical, search terms used)  |                  |
|             |  |  |                  |
| . DOCUM     | ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT   |  |                  |
| arctory .   | Citation of document with indication, where appropriate, of the  | e retevant passages Relevant   | to claim No.     |
| <b>,</b> .  | ACC.CHEM.RES.,   | : 1  |                  |
|             | vol. 28, 1995.   | :  |                  |
| 1           | pages 446-452, XP002035670   |  |                  |
|             | GRUBBS.R.H. ET AL.: "Ring-Clos   | sing   |                  |
|             | Metathesis and Related Processe  | 15 111   |                  |
| i           | Organic Synthesis"<br>* see in particular page 2450  | right-hand   |                  |
|             | column, reaction 9 and follow  | ina  |                  |
|             | discussion *   | • 119  |                  |
|             | see the whole document   |  |                  |
| .,          |  | RSCHUNG GMBH 2.9   |                  |
| Y           | WO 93 10121 A (BIOTECHNOLOG FO   | RSCHURG GRBH 2.5   |                  |
|             | ;CIBA GEIGY AG (CH)) 27 May 19 cited in the application  | ,  |                  |
|             | : see the whole document   |  |                  |
|             | See the whole document   | ·  | •                |
|             |  | -/   | -                |
|             |  | :  |                  |
|             |  |  |                  |
|             |  |  |                  |
| X Fur       | ther documents are listed in the continuation of hox C.  | Y atent family memners are listed in annex.  |                  |
| . Special c | ategones of cited documents:   | "T" later document published after the international filin   | e date           |
| *A* docum   | ment defining the general state of the art which is not  | or priority date and not in conflict with the applicat<br>cited to understand the principle or theory underlying | ion but          |
| cours       | dered to be of particular resevance  | invention  |                  |
|             | r document but published on or after the international gate.   | "X" document of particular relevance; the claimed inven<br>cannot be considered novel or cannot be considered    |                  |
| "L" docum   | nent which may throw doubts on priority claim(s) or  | involve an inventove step when the document is take  | n alone          |
| ana         | h is cited to establish the publication date of another on or other special reason (as specified)  | 'Y' document of paracular relevance; the claimed inven cannot be considered to involve an inventive step w       | hen the          |
|             | ment referring to an oral disclosure, use, exhibition or<br>r means  | document is combined with one or more other such ments, such combination being covious to a person               | docu-<br>siciled |
| 'P' docur   | thent published prior to the international filing date but than the priority date claimed  | in the art. "&" document member of the same patent family  |                  |
|             | or actual completion of the international search   | Date of mailing of the international search report   |                  |
|             | 21 July 1997   | 0 2.09.97  |                  |
|             |  | Authorized officer   |                  |
| Name and    | d mailing address of the ISA  European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2   | Authorized officer   |                  |
|             | NL - 2280 HV Rinmik<br>Tel. ( - 31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl.  | Stellmach, J   |                  |
| I           | Fax: ( - 31.70) 340-3016   | Sterniatil, J  |                  |

1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT Internation No PCT/DE 97/00111

| reford .     | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages   | Relevant to claim No. |
|--------------|--|-----------------------|
| <del></del>  |  |                       |
| <i>(</i> · · | J.ANTIBIOT., vol. 49, no. 6, June 1996, pages 560-563, XP002035370 GERTH,K. ET AL: "Epothilones A and B: Antifungal and Cytotoxic Compounds from Sorangium cellulosum (Myxobacteria)" see the whole document | 2,9                   |
| Y .          | CANCER RES., vol. 55, 1 June 1995, BALTIMORE, pages 2325-2333, XP002035371 BOLLAG,M.D. ET AL.: "Epoththilones, a New Class of Microtubule-stabilizing Agents with A Taxol-like Mechanism of Action"          | 2,9                   |
|              | cited in the application see the whole document  |                       |
| X            | J.ORG.CHEM.,<br>vol. 38, 1973, WASHINGTON,<br>pages 2136-2143, XP002035671<br>MEYERS,A.I. ET AL.:  | 4                     |
|              | * see page 2140, right-hand column, example 34 * see the whole document  |                       |
| Y            | HELV.CHIM.ACTA., vol. 4, 1983, BASEL, pages 1253-1261, XP002035672 KELLER-SCHIERLEIN.W. ET AL: "(3S,8E)-1,3-Dihydroxy-8-decen-5-on, ein Stoffwechselprodukt von Stryptomyces fimbriatus"                     | 2,7                   |
|              | * see page 1254, example 8 * see the whole document  |                       |
| Α            | CHEM.BER., vol. 100, 1967, WEINHEIM, pages 720-735, XP002035673 NERDEL,F. ET AL.: "Hepten-(6)-Säuren und Bicyclo[3.3.1]- bzw[3.2.0]heptanone-(6)" see the whole document                                     | 4,5                   |
| P,X          | ANGEW.CHEM.INT.ED.ENGL., vol. 35, no. 23/24, January 1997, WEINHEIM, pages 2801-2803, XP002035359 BALOG,A. ET AL.: "Total Synthesis of (-)-Epothilone A"   | 1-9                   |
|              | *see page 2803, scheme 4, examples 19, 11, 23 * see the whole document   |                       |
|              | -/   |                       |

1

Interna\_ mail Application No PCT/DE 97/00111

| Category * | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages   | Relevant to claim No. |
|------------|--|-----------------------|
| P,X        | J.AM.CHEM.SOC., vol. 119, no. 11, 1997, WASHINGTON, pages 2733-2734, XP002035373 MENG,D. ET AL.: "Remote Effects in Macrolide Formation through Ring-Forming Olefin Metathesis: An Application to the Synthesis of Fully Active Epothilone Congeners " " see page 2733, connection 2Z, as well as page 2734, right-hand column, scheme 4 * | 1,2,9                 |
| P,X        | TETRAHEDRON LETT., vol. 38, no. 12, 1997, OXFORD, pages 2061-2064, XP002035674 TAYLOR,R.E. ET AL.: "Towards the Synthesis of Epothilone A: Enantioselective Preparation of the Thiazole Sidechain and Macrocyclic Ring Closure " * see page 2062, fig.1, examples C13-C19, as well as page 2063, scheme IV *                               | 1,3,7                 |
| P,X        | ANGEW.CHEM.INT.ED.ENGL., vol. 36, no. 1/2, 1997, WEINHEIM, pages 166-168, XP002035364 YANG,Z. ET AL.: "Total synthesis of Epothilone A: The Olefine Metathesis Approach" * see page 166, examples 6, 10 as well as page 167, examples 6,10,11 * see the whole document   | 1-9                   |
| P, Y       | LIEBIGS ANN.CHEM.,  December 1996, WEINHEIM, pages 2135-2140, XP002035675 BLECHERT,S. ET AL.: "Synthesis of (-)-Streptenol A,(1-)-Streptenol B, C and D" see the whole document  | 8                     |
| P,Y        | J.ORG.CHEM., vol. 61, no. 23, 1996, WASHINGTON, pages 7998-7999, XP002035361 MENG,D, ET AL: "Studies toward a Syntesis of Epothilone A: Use of Hydropyran Templates for the Management of Acyclic Stereochemical Relationships" see the whole document   | 1-9                   |

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/DE 97/00111

|            |  | PC1/DE 9//00111       |
|------------|--|-----------------------|
|            | uon) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT   |                       |
| Calegory * | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages   | Relevant to claim No. |
| P,Y        | J.ORG.CHEM., vol. 61, no. 23, 1996, WASHINGTON, pages 8000-8001, XP002035362 BERTINATO,P. ET AL.: "Studies toward the Synthesis of Epothilone A: Stereocontrolled Assembly of the Acyl Region and Models for Macrocyclisation" see the whole document    | 1-9                   |
| Ρ,Υ        | ANGEW.CHEM.INT.ED.ENGL., vol. 35, no. 20, November 1996, WEINHEIM, pages 2399-2401, XP002035372 NICOLAOU,K.C.ET AL.: "An Approach to Epothilones Based on Olefin Methathesis" * see page 2400, examples 6,8 as well as scheme 3 * see the whole document | 1-9                   |
| Ε          | WO 97 19086 A (BIOTECHNOLOG FORSCHUNG GMBH; HOEFLE GERHARD (DE); KIFFE MICHAEL (D) 29 May 1997 see the whole document  | 1-9                   |
|            |  |                       |
|            |  |                       |
|            |  |                       |
|            |  |                       |
|            |  |                       |
|            |  | İ                     |
|            |  |                       |
|            |  | •                     |
|            |  |                       |
|            |  |                       |
|            |  |                       |
|            |  |                       |
|            |  |                       |
|            |  |                       |
|            |  |                       |
|            |  |                       |
|            |  |                       |
|            |  |                       |
|            |  |                       |
|            |  |                       |
|            | <u> </u>   |                       |

#### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

PCT/DE 97/00111

| Patent document cited in search report | Publication<br>date | Patent family member(s)      | Publication date     |
|--|---------------------|------------------------------|----------------------|
| WO 9310121 A                           | 27-05-93            | DE 4138042 A<br>AU 2943792 A | 27-05-93<br>15-06-93 |
| WO 9719086 A                           | 29-05-97            | DE 19542986 A                | 22-05-97             |

PCT/DE 97/00111

KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES K 6 C07D493/04 C07C47/21 C07D319/06 C07D277/24 C07C59/01 Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK **B. RECHERCHIERTE GEBIETE** Recherchierter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) C07D IPK 6 Recherchierte aber rucht zum Mindestprusstoff gehorende Verolsentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Wahrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank) und evil, verwendete Suchbegnffe) C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Verossendichung, soweit ertorderlich unter Angahe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr. Kategone" 1 ACC.CHEM.RES., Υ Bd. 28, 1995, Seiten 446-452, XP002035670 GRUBBS, R.H. ET AL.: "Ring-Closing Metathesis and Related Processes in Organic Synthesis" \* siehe insbesondere Seite 2450, rechte Spalte, Reaktion 9 und folgende Diskussion \* siehe das ganze Dokument WO 93 10121 A (BIOTECHNOLOG FORSCHUNG GMBH 2.9 γ ;CIBA GEIGY AG (CH)) 27.Mai 1993 in der Anmeldung erwähnt siehe das ganze Dokument -/--Siehe Anhang Patentiamilie Weitere Veröffentlichungen und der Fortsetzung von Feld C zu Χ entnehmen T Spatere Veroffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Priontatsdatum veroffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verstandnis des der Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen 'A' Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theone angegeben ist aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfindenischer Taugkeit heruhend betrachtet werden Anmeldedatum veröffentlicht worden ist Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweiselhast er-scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Taugkeit berühend helrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verhindung gehracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheltegend ist anderen im Recherchenbericht genannten Veroffentlichung belegt werden -ysoll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veroffentlichung, die sich auf eine mundliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist dem beanspruchten Prionutsdatum veröffentlicht worden ist Absendedatum des internationalen Recherchenberichts Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 0 2.09.97 21.Juli 1997 Name und Postanschrift der Internationale Recherchenbehörde Bevollmachtigter Bediensteter Europaisches Pawntami, P.B. 5818 Patentiaan 2 NI. - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. Stellmach, J Fax: (+31-70) 340-3016

1

Internauonales Aktenzeichen
PCT/DE 97/00111

|              |   | PCT/DE 97          | //00111 |
|--------------|---|--------------------|---------|
|              | mg) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN  |                    |         |
| Kategorie*   | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kom  | Betr. Anspruch Nr. |         |
| Υ            | J.ANTIBIOT., Bd. 49, Nr. 6, Juni 1996, Seiten 560-563, XP002035370 GERTH,K. ET AL: "Epothilones A and B: Antifungal and Cytotoxic Compounds from Sorangium cellulosum (Myxobacteria)" siehe das ganze Dokument  |                    | 2,9     |
| Y            | CANCER RES., Bd. 55, 1.Juni 1995, BALTIMORE, Seiten 2325-2333, XP002035371 BOLLAG,M.D. ET AL.: "Epoththilones, a New Class of Microtubule-stabilizing Agents with A Taxol-like Mechanism of Action" in der Anmeldung erwähnt siehe das ganze Dokument |                    | 2,9     |
| X            | J.ORG.CHEM., Bd. 38, 1973, WASHINGTON, Seiten 2136-2143, XP002035671 MEYERS,A.I. ET AL.: * siehe Seite 2140, rechte Spalte, Beisp. 34 *   |                    | 4       |
| Y            | siehe das ganze Dokument  HELV.CHIM.ACTA., Bd. 4, 1983, BASEL, Seiten 1253-1261, XP002035672 KELLER-SCHIERLEIN,W. ET AL: "(3S,8E)-1,3-Dihydroxy-8-decen-5-on, ein Stoffwechselprodukt von Stryptomyces  |                    | 2,7     |
| A .          | fimbriatus"  * siehe Seite 1254, Beispiel 8 * siehe das ganze Dokument  CHEM.BER., Bd. 100, 1967, WEINHEIM, Seiten 720-735, XP002035673 NERDEL,F. ET AL.: "Hepten-(6)-Säuren und  |                    | 4,5     |
| P <b>,</b> X | Bicyclo[3.3.1] - bzw[3.2.0]heptanone-(6)" siehe das ganze Dokument ANGEW.CHEM.INT.ED.ENGL.,   |                    | ì-9     |
|              | Bd. 35, Nr. 23/24, Januar 1997, WEINHEIM, Seiten 2801-2803, XP002035359 BALOG,A. ET AL.: "Total Synthesis of (-)-Epothilone A" * siehe Seite 2803, Schema 4, Beispiele 19,11,23 * siehe das ganze Dokument  |                    |         |
|              | -/  |                    |         |

T

PCT/DE 97/00111

| 37/00111           |
|--------------------|
| Betr. Anspruch Nr. |
| 1,2,9              |
| 1,3,7              |
| 19                 |
| 8                  |
| 1-9                |
|                    |

Internalizates Aktenzeichen
PCT/DE 97/00111

| (Forusezu   | NE ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN   |                    |  |
|-------------|---|--------------------|--|
| Alegoric*   | Bezeichnung der Verolfentlichung, sowat erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Tale  | Betr. Anspruch Nr. |  |
| Y, Y        | J.ORG.CHEM., Bd. 61, Nr. 23, 1996, WASHINGTON, Seiten 8000-8001, XP002035362 BERTINATO,P. ET AL.: "Studies toward the Synthesis of Epothilone A: Stereocontrolled Assembly of the Acyl Region and Models for Macrocyclisation" siehe das ganze Dokument | 1-9                |  |
| <b>Υ</b> ,Υ | ANGEW.CHEM.INT.ED.ENGL., Bd. 35, Nr. 20, November 1996, WEINHEIM, Seiten 2399-2401, XP002035372 NICOLAOU,K.C.ET AL.: "An Approach to Epothilones Based on Olefin Methathesis" * siehe Seite 2400, Beips. 6, 8 sowie Scheme 3 * siehe das ganze Dokument | 1-9                |  |
| Ε           | WO 97 19086 A (BIOTECHNOLOG FORSCHUNG GMBH;HOEFLE GERHARD (DE); KIFFE MICHAEL (D) 29.Mai 1997 siehe das ganze Dokument  | 1-9                |  |
|             |   |                    |  |
|             | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,   |                    |  |
|             |   |                    |  |
|             |   | • •                |  |
|             |   |                    |  |
|             |   |                    |  |
|             |   |                    |  |
|             |   |                    |  |
|             |   |                    |  |
|             |   |                    |  |
|             |   |                    |  |
|             |   |                    |  |
|             |   |                    |  |

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur seiben Patentfamilie gehoren

PCT/DE 97/00111

| 1 |   |                                |                                   | 1 ,                           |  |  |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|--|
| / | Im Recherchenbericht<br>angefuhrtes Patentdokumen | Datum der<br>t Veroffendichung | Mitglied(er) der<br>Patentfamilie | Datum der<br>Veroffentlichung |  |  |
|   | WO 9310121 A                                      | 27-05-93                       | DE 4138042 A<br>AU 2943792 A      | 27-05-93<br>15-06-93          |  |  |
|   | WO 9719086 A                                      | 29-05-97                       | DE 19542986 A                     | 22-05-97                      |  |  |
|   |   |                                | AU 2943792 A                      | 15-06-93                      |  |  |